

CUADRO CARACTERÍSTICO DEL GENERO BOLETUS

Autor Alfonso Rey Pazos
lunes, 12 de noviembre de 2007

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y MORFOLÓGICAS

PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL GÉNERO BOLETUS

GÉNERO Y ESPECIE

COLOR DE LA ESPORADA

SOMBRERO

PIE

TUBOS Y POROS

COLOR DE LA CARNE Y HÁBITAT

Strobilomyces strobilaceus

Pardo oscuro.

Escamas gruesas muy evidentes. Borde prolongado en una ancha dentelladura.

Muy fibroso, cubierto enteramente por una lanosidad.

Largos, anexos, blanquecinos, grises. Poligonales.

Se tiñe de rojizo (inmutable en la variedad *floccopus*). Bosques de frondosas.

Porphyrellus porphyrosporus

Ligeramente ocráceo.

Muy liso y finamente aterciopelado.

No reticulado, rugoso ni áspero, sino cubierto de finísima pruina.

Anexos al pie o semilibres. Ovals o angulosos. Color fuliginoso con reflejos rosados.

Se colorea de rosa o azul y con el tiempo se vuelve negruzca. Bosques de coníferas y mixtos.

Gyroporus castaneus

Amarillo limón.

Aterciopelado, liso o ligeramente tomentoso.

Esponjoso-cavernoso, liso o un poco aterciopelado.

Cortos, en forma de almohada, libres. Ovoidales, redondos, blanco amarillentos.

Blanca inmutable. Especialmente en bosques de frondosas.

Gyroporus cyanescens

Hialina al microscopio.

Carnoso, tomentoso, seco.

Esponjoso, cavernoso, engrosado en la base.

Tubos libres. Poros amarillentos o blancos, azules al tacto.

Blanca, al tacto o corte vira intensa y rápidamente al azul índigo.

Leccinum nigrescens

Amarillo pálido.

Finamente aterciopelada; la superficie se agrieta en numerosas areolas.

Ventrudo, después alargado, adelgazado en la parte alta, ligeramente reticulado surcado.

Tubos libres al pie. Poros angulosos redondeados, amarillo pálido.

Amarillo pálido, al corte vira primero a lila y finalmente a negro. Frondosas (encinas y hayas).

Leccinum lepidus

Oliváceo.

De joven finamente aterciopelado, luego liso y glabro, viscoso y brillante en tiempo húmedo.

Bastante regular, atenuado hacia abajo y decorado por pequeñísimas fibrillas concoloradas.

Tubos redondeados en el pie. Poros redondos a angulosos, amarillo limón, luego ocráceos con tinte oliváceo, negruzco.

Blanco amarillenta, al corte vira lenta y ligeramente al rosa; sobre todo en la parte alta del pie. Solamente bajo encinas mezcladas con carrascos.

Leccinum corsicus

Marrón tabaco.

Cutícula seca y aterciopelada. Color anaranjado, rojo anaranjado o marrón rojizo.

Grueso, ventrudo, algo engrosado en la base, subradicante. Cubierto por pequeñas escamas de color blancuzco a naranja pardusco.

Tubos adherentes. Poros pequeños, redondos y angulosos, en la vejez amarillo oro y ocráceo oliváceo en el adulto.

Blanquecino, prácticamente inmutable, al contacto del aire se sonroja levemente en la parte superior del pie. Poco común en otros hábitats que no sean de jaras (*Cystus*).

Leccinum rufus

Marrón ocráceo.

Convexo o en forma de almohadilla, con una cutícula seca, de color anaranjado, rojo anaranjado o marrón rojizo.

Muy largo, blanquecino, cubierto por pequeñas escamas de blanquecinas a naranja parduscas.

Tubos muy largos, casi libres del sombrero. Poros pequeños, color crema o crema grisáceos.

Tiende al color negro y no al azul, pero generalmente muy variable (verde, azul, rojo, violeta). Típicamente de chopos y abedules.

Leccinum versipellis

Ocráceo.

Cutícula adnata, pubescente, después lisa. En tiempo seco se resquebraja en la vejez. Amarillo anaranjado ocráceo.

Cilíndrico o claviforme, recto o curvado, decorado de escamas oscuras, casi negras, sobre fondo blanco.

Tubos largos, libres y redondeados en el pie. Poros pequeños, redondos, blanco grisáceos, después oscurecen a ocre grisáceos.

Blanca, al corte vira al rosa lila, en la base del pie verde azulado, ennegreciendo a los pocos minutos. Típico de abedules y chopos.

Leccinum quercinum

Pardo oliváceo.

Superficie decorada con fibrillas escamadas, luego liso. Rojo ladrillo, pardo castaño, pardo roña.

Cilíndrico, hacia la base inflado, con escamaduras flocosas unidas entre sí, de blancas a parduscas, pardo roña o púrpura fino a pardo oscuro.

Tubos más bien largos. Poros redondos, crema grisáceos a gris ocráceo.

Blanquecina; que pasa al rojo rosa en el sombrero, color vinoso en el pie donde en la base puede tener alguna difuminación verdosa. Robles y encinas.

Leccinum vulpinus

Amarillo pardusco a marrón claro.

Seco en la superficie; ligeramente aterciopelado, de rojo ladrillo a parduzco rojo.

Recubierto por pequeñas escamosidades gris parduzco-negrusco; sobre el fondo casi siempre difuminado de azul oscuro.

Tubos muy largos. Poros pequeños y redondos, blanco gris a parduscos de adulto.

Carne al corte vira a lila y después al violeta oscuro. En la base del pie azul verdoso. Crece bajo coníferas; a veces en bosques mixtos.